



«Ուիգմոր կանանց և երեխաների հիվանդանոց»
Յ. Ներսիսյան 10/7, Երևան 0014,
+374 12345678

«Ուիգմոր ընտանիքի առողջության կենտրոն»
Պուշկին 56, Երևան 0002, Հայաստան
+374 12345677

www.wigmore.am

ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԴԻԱԲԵՏ

ՀՈՒՇԱԹԵՐԹԻԿ ԾՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ



ԻՆՉ Ե ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԴԻԱԲԵՏԸ

Շաքարային դիաբետը քրոնիկ հիվանդություն է, որը բնորոշվում է հիպերգլիկեմիայով՝ արյան գլյուկոզայի բարձրացումով: Այն առաջանում է ինսուլինի արտազատման խանգարման և/կամ ինսուլինի ազդեցության խանգարման հետևանքով:

Ինսուլինը հորմոն է, որն արտադրվում է ենթաստամոքսային գեղձի, այսպես կոչված՝ «Լանգերհանսյան կղզակների» բետտա-բջիջներում: Ինսուլինի ոչ լիարժեք արտազատումը և/կամ ինսուլինի անբավարար ազդեցությունը թիրախ-հյուսվածքների վրա առաջացնում է ածխաջրատային, ճարպային և սպիտակուցային փոխանակության խանգարումներ:



ԻՆՉՊԵՍ ԲՈՒԺԵԼ ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԴԻԱԲԵՏԸ

Շաքարային դիաբետ տիպ 1-ի միակ բուժումը ինսուլինաթերապիան է: Այն իրականացվում է ենթամաշկային ներարկումների ձևով:

Ինսուլինաթերապիայի ժամանակ խորհուրդ է տրվում՝

1. օրը 6-8 անգամ չափել գլյուկոզան արյան մեջ,
2. հաշվել սննդում ածխաջրատների քանակը,
3. հաշվի առնել ֆիզիկական ակտիվությունը:

ԻՆՉՊԻՍԻ՝ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱՌԱՋԱՆԱԼ ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԴԻԱԲԵՏԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ

Զկոմպենսացված շաքարային դիաբետի հետևանքով առաջանում են սուր և քրոնիկ բարդություններ:

Սուր բարդություններից է հիպոգլիկեմիան (գլյուկոզայի նորմայից ցածր մակարդակ), ընդհուպ մինչև հիպոգլիկեմիկ կոմա:

Քրոնիկ բարդություններից են՝

1. Երկկամների ախտահարում (նեֆրոպաթիա),
2. Աչքերի ցանցաթաղանթի ախտահարում (ռետինոպաթիա),
3. Սիրտ-անոթային հիվանդություններ,
4. Ծայրամասային անոթների և նյարդերի ախտահարում:

Շաքարային դիաբետի բարդություններից խուսափելու համար անհրաժեշտ է՝

1. Արյան գլյուկոզայի մակարդակը պահել նորմայի սահմաններում:
2. Դիսամիկ հսկողություն Էնդոկրինոլոգի կողմից:



ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԴԻԱԲԵՏԻ ԻՆՉ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ԿԱՆ

1 ՏԻՊ 1 Այս ժամանակ տեղի է ունենում բետտա-բջիջների աուտոիմուն ախտահարում, որի հետևանքով ինսուլինի արտադրությունը օրգանիզմում պրակտիկորեն բացակայում է: Առավել բնորոշ է երեխաներին: Բուժումը՝ ինսուլինաթերապիա:

2 ՏԻՊ 2 Այս ժամանակ խանգարված է ինսուլինի ազդեցությունը և/կամ սեկրեցիան: Առավել բնորոշ է մեծահասակներին: Բուժումը՝ շաքար իջեցնող հաբեր:

ՈՐ ԱՆՏԱՆԻՇՆԵՐԻ ԴԵՂՔՈՒՄ ԴԻՄԵԼ ԲԺՇԿԻ

- Արտահայտված ընդհանուր թուլություն,
- Զաշի կտրուկ կորուստ,
- Ծարավի անհագ զգացում,
- Շատախմություն,
- Հաճախամիզություն:



Այս բոլոր գանգատների դեպքում խորհուրդ է տրվում որոշել գլյուկոզան արյան մեջ:

ՈՒԻԳՄՈՐ՝ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՅ, ՈՐ ՍԻՐՏ ՈՒՆԻ...

